

QUESTÕES DISSERTATIVAS

Transcreva em no máximo 15 linhas, as respostas das questões dissertativas, com caneta azul ou preta, para o cartão de respostas.

1) Cite as principais diferenças entre os enxertos de pele parcial e total.

Enxerto de pele parcial:

- epiderme e espessura parcial da derme
- menor contração primária
- maior contração secundária
- área doadora cicatriza por reepitelização

Enxerto de pele total:

- epiderme e espessura total da derme
- resultado cosmético melhor
- maior contração primária
- menor contração secundária
- área doadora deve ser fechada primariamente (sutura)

2) Conforme a Resolução da Diretoria Colegiada nº 220 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, de 27 de dezembro de 2006, existem 25 critérios de exclusão da doação de pele de origem humana. Cite 10 critérios.

- 1- Contaminação por substâncias tóxicas nos últimos 12 meses
- 2- Uso de drogas injetáveis ilícitas nos últimos 12 meses
- 3- Comportamento de risco nos últimos 12 meses
 - a. Sexo em troca de dinheiro ou droga
 - b. Múltiplos parceiros sexuais
 - c. Relações sexuais com parceiros contaminados por HIV, hepatite ou C ou outras infecções transmitidas por sangue
 - d. Pessoas detidas por mais de 24h em cadeias
 - e. Tatuagens e acupunturas sem comprovação de segurança
- 4- Neoplasias malignas com potencial de metástase
- 5- AIDS
- 6- Enfermidade neurológica degenerativa e debilitante
- 7- Tuberculose ativa
- 8- DST
- 9- Grandes queimaduras
- 10- Malária: doença ou residência em área endêmica nos últimos 36 meses quando não houver possibilidade de comprovação laboratorial da ausência da doença
- 11- Enfermidade de CREUTZFELDT JAKOB
- 12- Doença de etiologia desconhecida
- 13- Tratamento com hormônio de crescimento derivado da pituitária humana
- 14- Transplante de órgãos e tecidos em prazo inferior a doze meses, exceto transplante de duramater, córnea ou esclera que excluem definitivamente a doação
- 15- Tratamento com radio ou quimioterapia
- 16- Cirurgias por causas não definidas
- 17- Desconhecimento do resultado de cirurgia/biopsia prévia em lesão musculoesquelética ou cutânea
- 18- Icterícia de causa não obstrutiva
- 19- Morte de causa desconhecida
- 20- Infecção bacteriana ou fúngica sistêmica
- 21- Transfusão de hemoderivados e hemocomponentes há menos de 12 meses
- 22- Hidratação duas horas antes que possa hemodiluir 50% o volume intravascular anterior ao momento da colheita da sorologia
- 23- Infusão de colóides sintéticos nas 48 horas precedentes a colheita de sangue para sorologia
- 24- Suspeita de contaminação com hemoderivados ocorrida nos últimos 12 meses
- 25- Critérios que a BTME/BP julgar pertinente